

Józefa [illegible], 1883 roku

34
45
36
30
50
20
15
45

295
25
320

Józef Zieliński

Joseph Zielinski
8707 Escanaba ave.
So. Chicago Ill



#89030

Фармация

Фармация разсматриваетъ врачебныя средства во всѣхъ отношенияхъ какъ то откуда они получаются, обработывания ихъ и хранение, а также описывает различныя ихъ свойства.

Врачебныя средства получаются изъ трехъ царствъ природы

1е Царство Растительное
2е Царство Животное
3е Цар. Минеральное или Ископаемое

А. Царство Растительное

Agaricus Chirurgorum / Врачебная губка / Приготовляется изъ грибовъ растущихъ на старыхъ пняхъ. Она представляетъ мягкия бархатистые кусочки, употребляется для остановления кровотечений.

Lichen Islandicus / **Исландскій**
или грудной мохъ / Сѣраго цвѣта безъ
запаха, горьковатаго вкуса; Изъ него при-
готовляютъ отваръ Decoctum и студень
Gelatina.

Корни Radices

Radix Althaeae / **Проскурнякъ**
Бѣлаго цвѣта, слизистаго вкуса. Изъ
него приготовляютъ отваръ и сиропъ
Syrupus Althaeae, кромѣ того онъ вхо-
дитъ въ составъ многихъ сборовъ, а поро-
шокъ его входитъ въ составъ сложныхъ
порошковъ.

R. Armoraciae / **Хрѣнъ** / Упот-
ребляется въ истертомъ видѣ, какъ
средство наводящее красноту, а такъ
же для ножныхъ ваннъ. Настойку хрѣ-
на пивѣ или винѣ назначаютъ какъ же-
лудочное и противо цынготное средство.

R. Calami Aromatici / Аиръ приятнаго запаха, пряного вкуса. Употребляется внутрь въ видѣ наливки какъ возбуждающее средство, а снаружи для дѣтскихъ ваннъ. Порошокъ его входитъ въ составъ зубнаго порошка Pulvis Dentifricius.

Rad. Colchici / Безвременникъ / Имѣетъ видъ яйцеобразной луковицы, отвратительнаго горькаго вкуса. Изъ него приготовляютъ Oleum Colchici и Trae Colchicae которые назначаются внутрь до 30 к. на пріемъ при ломотѣ.

R. Dauci carotae / Морковь Употребляется въ истертомъ видѣ для очищенія гангренозныхъ язвъ, и какъ смягчительное средство

R. Filicis maris / Папоротникъ / Снаружи бураго внутри зеленоватаго цвѣта, вкусъ не пріятный

горьковатый. Порошокъ его употребляется внутрь въ видѣ кашки отъ ʒj до ʒij на пріемъ; кромѣ того приготовляютъ Extractum aethereum Filicis maris которое дѣйствуетъ лучше и назначаютъ отъ ∋j. до ʒß. на пріемъ.

<u>Rad. Graminis</u> / <u>Пырей</u> / похожъ на соломенку сладковатаго вкуса. Изрѣзанный корень входитъ въ составъ кровочистительныхъ сборовъ, а такъ же изъ него приготовляютъ отваръ и Extractum.

<u>R. Jalapae</u> / <u>Ялапа</u> / представляетъ бугристые округленные куски, бураго цвѣта; вкусъ непріятный. Употребляется какъ слабительное отъ 10 до 20 gr. на пріемъ.

<u>R. Ipecacuanhae</u> / <u>Рвотный корень</u> / Представляетъ тонкіе кольчатые куски, сѣро-пепельнаго цвѣта; вкусъ горькій отвратительный. Употребляется въ видѣ наливки отъ ℈j до ʒß, на ℥vj к.
Порошокъ его дается отъ 10 до 20 gran.

какъ рвотное и входитъ въ составъ доверовaго порошка Pulveris Doveri Препар. Syrupus Ipec. Vinum et Tra.

R. Liquiritiae / Лакричникъ или солодковый корень / Покрытъ бураго коричнего, а внутри желтаго цвѣта; запахъ особенный, вкусъ сладкій. Употребляется въ видѣ отвара Препар. Syrupus et Extractum Liquiritiae.

R. Ratanhiae / Ратанія / красно-бураго цвѣта, сильно вяжущаго вкуса; Употребляется въ видѣ отвара Препар: Tinct. Ext. Ratanhiae.

R. Rhei / Ревень / Лучшій сортъ этаго корня есть тотъ, который привозится въ Россію сухимъ путемъ. Онъ представляетъ округленные величиною до кулака, желтаго цвѣта съ бѣлыми и красными полосками; запахъ особенный, вкусъ горьковатый непріятный. При

жевании онъ хруститъ и слюна окрашивается въ желтый цвѣтъ. Порошокъ ревеня дается отъ 2хъ до 20 др. напрiемъ какъ слабительное и входитъ въ составъ многихъ сложныхъ порошковъ кашекъ и пилюль. Препор. Tra Rhei aquosum, Tra Rhei Spirituosum, Tra Rhei vinosa, Syrupus Rhei Extractum, Rhei simplex et Extractum Rhei compositum.

R. Salep (Ятрышникъ) Представляетъ нанизанные кусочки, въ орѣхъ величиною, сѣроватаго цвѣта; вкусъ слизистый. Употребляется въ видѣ отвара ʒj на ℥vj колатуры.

R. Sarsaparillae (Сарсапарель) Представляетъ длинные толщиною въ перо куски темно-бураго цвѣта, вкусъ немного горьковатый. Употребляется въ видѣ отвара и входитъ въ составъ сборовъ напр. Spetum Zittmani.

R. Scillae (Морской лукъ) высу-
шенные чешуйки морскаго лука бѣлаго
цвѣта, отвратительнаго горькаго вку-
са; запахъ послѣ высушеванія изче-
заетъ. Порошокъ его дается отъ ß gr до ij gr
наприемъ въ порошкахъ и пилюляхъ Пр.
Fra Extractum et Oxymel Scillae

R. Senegae (Сенега) Искривленный
корень желтовато-сѣраго цвѣта тол-
щиною въ перо; вкусъ противный про-
изводящій слюнотеченіе. Сенега употреб-
ляется въ видѣ отвара отъ ʒj до ʒiij на ℥vj к.

R. Taraxaci (Одуванчикъ) Мор-
щинистый, бураго цвѣта, горьковата-
го вкуса; употребляется въ видѣ сборовъ,
а кромѣ того приготовляютъ Ext.
Taraxaci.

R. Valerianae (Маунъ) Состоитъ
изъ короткаго стержня и покрывающихъ

его мочекъ, сѣро-бураго цвѣта; запахъ особенный, непріятный; вкусъ горьковато-острый. Употребляется въ видѣ настойки отъ ʒj до ʒij на ℥vj колатуры, а порошокъ его дается отъ 10 до 20 гр. на пріемъ въ кашках и пилюляхъ. Препараты Tra Valerianae simplex Tra V-nae Aetherea, Tra V-nae ammoniata, Oleum Aethereum V-nae, Aq. V-nae и Extum spirituosum V-nae.

R. Zingiberis (Имбирь) Корень вѣтвистый, желто-сѣраго цвѣта; запахъ пріятный, сильно ароматный; вкусъ пряный жгучій. Имбирь входитъ въ составъ ароматнаго порошка Pulvis aromaticus и ароматной настойки Tinctura Aromatica.

Деревья Ligna

Lignum Guajaci (Бакаутовое дерево) Обыкновенно представляетъ

желтоватые стружки Rasura тонущія въ водѣ, вкусъ горьковатый. Употребляется въ видѣ отвара и входитъ въ составъ сборовъ напримѣръ Species Lignorum Преп. Tinctura et Extractum.

Lignum Quassiae (Квассія) представляетъ стружки, сильно горькаго вкуса. Употребляется какъ желудочное средство, въ видѣ водной и винной наливки Infusum Quassiae aquosum et vinosum Преп. Tra et Extractum.

Стебли Stipites

Stipites Dulcamarae (Сладко-горькій Паслёнъ) толщиною въ перо, желто-сѣраго цвѣта. Употребляется въ видѣ отвара и входитъ въ составъ сборовъ Препараты Extractum.

Корки Cortices

Cortex Chinae (Хинная корка) Въ продажѣ находится до 50 сортовъ хинныхъ корокъ, которыя отличаются по виду, цвету и особенно по содержанию хинина. По цвету бываютъ: Сѣрыя Cortex Chinae grisei, красныя Cort. Chinae rubri, желтыя Cort. Chinae flava и бѣлыя Cort. Ch. albi. Всѣ они представляются или въ видѣ трубокъ или въ видѣ плоскихъ кусковъ различной величины. Запахъ хинныхъ корокъ дубильный; вкусъ горькій, вяжущій. Употребляется въ видѣ водной и винной настойки, Inf. Chinae aquosum et vinosum frigidae et calide paratum а также въ видѣ отвара съ прибавлениемъ какой нибудь кислоты Decoctum chinae acidulatum Порошокъ ихъ дается до 30 gr. на пріемъ и выходитъ

въ составъ кашекъ и пилюль, а снару-
жи употребляется въ видѣ зубнаго по-
рошка. Преп. Trae Chinae et Extractum.

Хининъ Обыкновенно употребляет-
ся въ видѣ сѣрно-кислаго хинина Chi-
ninum sulfuricum, который представ-
ляетъ бѣлый легкій порошокъ, сильно-
горькаго вкуса; дается отъ 1 gr до 3; на
пріемъ въ порошкахъ или въ растворѣ.

Cortex Cinnamomi (Корица)
Представляетъ трубочки красно-бураго
коричневаго цвѣта; запахъ пріятный,
вкусъ пряный жгучій. Порошокъ кори-
цы входитъ въ составъ сложныхъ по-
рошковъ и служитъ для опыливанія
пилюль. Препараты: Aqua Cinnamo-
mi Oleum Aethereum et Syrupus.

Cort. Mezerei (Волчье лыко)
Представляетъ лентовидные куски

съ одной стороны бураго съ другой бѣло-
ватаго цвѣта; вкусъ острый, сильно жгучiй.
Волчье лыко входитъ въ составъ зборовъ
чаще же употребляется снаружи, какъ
средство наводящее краснату.

6. Quercus (Дубовая корка)
Представляетъ желобоватые куски бу-
раго цвѣта съ бѣловатыми пятнами;
вкусъ сильно вяжущiй. Употребляется
въ видѣ отвара для вспрыскиванiй по-
лосканiй и примочекъ.

Листья Folia

Folia Belladonnae (Красавка
или Сонная одурь) горьковато ос-
траго вкуса. Употребляется въ видѣ
настойки для глазныхъ примочекъ отъ
ʒj до ʒij на ℥vj колатуры, а порошокъ кра-
савки дается внутрь до 3 gr. на прiемъ
Препар: Extractum, Tra, Unguentum
и Emplastrum; кромѣ того

изъ сонной одури получаютъ Ат-
ропинъ очень сильное вещество.

Folia Lauro Cerasi / Лавровишневыя листья / Продолговаты по краямъ мелко пильчатые, запахъ сѣмянъ горько миндальный, вкусъ пряный. Изъ нихъ перегонкою получаютъ Aqua Lauro cerasi которое часто употребляется какъ успокаивающее средство около 10 к. напр.

Fol. Sennae / Александрійскія листья / Небольшія ланцетовидные, приторнаго вкуса. Употребляются какъ слабительное въ видѣ наливки отъ ʒß, до ʒiv. колат., а порошокъ ихъ дается около ʒj на пріемъ въ порошкахъ или кашкахъ.

Травы Herba

Herba Absinthii / Полынь

Серо-зеленаго цвѣта, запахъ аро-
матный, особенный; вкусъ сильно горь-
кій. Употребляется въ видѣ настойки.
Препор: Тra Absinthii.

Hb-ва Conii maculati. / Hb-ва
Cicutae / Болиголовъ / Одуря-
ющаго запаха, остраго непріятна-
го вкуса; рѣдко употребляется внутрь
въ маленькихъ пріемахъ, а назнача-
ются снаружи въ видѣ пластыря Em-
plastrum Cicutae.

Hb-ва Digitalis / Наперстян-
ка / Сильно горькаго отвратитель-
наго вкуса. Употребляется внутрь въ
видѣ настойки отъ 1/2 до 3β, на ℥vj кол.,
а порошокъ ея дается отъ 1/4 до 3 gr.
на пріемъ. Препорат. Тra Extract.
и Unguentum Digitalis кромѣ того
изъ Наперстянки получаютъ Дигиталинъ весьма сильное вещество.

Hba Hyoscyami / Бѣлена / Имѣетъ большіе листья сѣро зеленаго цвѣта; запахъ одуряющій, вкусъ горьковато острый. Употребляется для припарокъ. Пречгот: Extractum Hyoscyami назначается снаружи и внутрь до ½ др. напріемъ и Oleum Hyoscyami назначается только снаружи.

Hb-ва Meliloti / Донная трава / Ароматнаго запаха; снаружи для пріготовленія пластыря Emplastr. Meliloti.

Hb-ва Menthae crispae / Кудрявая и Hb-ва Menth. piperitae Перечная мята / Листья кудрявой мяты морщинисты, а перечной гладкіе. Обѣ пріятнаго, особеннаго запаха, пряннаго вкуса. Употребляются

въ видѣ чая и сборовъ Препор: Aqua, Oleum Aethereum et Tinctura.
Hb-ba Salviae (Шалфей) Ароматнаго запаха, употребляется въ видѣ наливки внутрь, а также для полосканій Преп. Oleum Aethereum et Aqua Salviae
Hb-ba Trifolii fibrini (Вахта) горькаго вкуса, употребляется въ видѣ сборовъ въ водной и винной наливки.

Цвѣты Flores

Flores arnicae (Цвѣты Баранника) темно желтаго цвѣта; запахъ неприятный, ароматный, вкусъ раздражающій; употребляется внутрь въ видѣ наливки отъ 3i, до 3ij на 3vij к. Преп: Tra florum arnicae которое назначается съ свинцовою водою для примочекъ при ушибахъ.

Flor. Chamomillae / Обыкновенная ромашка. Особеннаго ароматнаго запаха, пряннаго вкуса; употребляется въ видѣ настойки и входитъ въ составъ многихъ сборовъ. Препар: Aq. и Oleum Aethereum / Синяго цвѣта.

Flor. Rosarum / Розовые цвѣты весьма пріятнаго запаха, слабо вяжущаго вкуса: Употребляется въ видѣ настойки для полосканій. Препар: Mel rosatum Aqua et Oleum Aether.

Flor. Sambuci / Бузина, Особеннаго запаха, Употребляется въ видѣ чая какъ потогонное средство и входитъ въ составъ сборовъ. Препар: Aqua Sambuci

Fl. Tiliae / Липовые цвѣты Запахъ свѣжихъ цвѣтовъ пріятный, высушенные не имѣютъ запаха;

Употребляется какъ потогонное въ смѣси чая и входятъ въ составъ сборовъ.

Плоды Fructus

Baccae J. Piper Cubebae / Кубеба / Похожа на зерна обыкновеннаго перца, съ хвостиками; запахъ сильный, особенный; вкусъ горьковато острый. Употребляется въ видѣ кашекъ и пилюль отъ ℈i, до ʒj напрiемъ какъ противо перелойное средство. Препараты: Oleum Aethereum и Ex-tum Aethereum Cubebarum.

Baccae Juniperi / Можжевеловые ягоды / Сине черного цвета величиною въ горохъ, запахъ смолистый; вкусъ сладковатый. Употребляются какъ отличное мочегонное средство въ видѣ настойки или отвара.

Baccae Rubi Idei (Малина) Употребляется въ видѣ чая какъ потогонное средство, изъ свѣжихъ приготовляютъ Syrupus и aq. Rubi Idei.

Fructus capsici annui (Стручковый или турецкій перецъ) Представляетъ продолговатую, краснаго цвѣта ягоду; запаха не имѣетъ, вкусъ жгучій. Употребляется въ видѣ настойки T-ra Capsici annui для втиранія при ломотѣ.

Poma Colocynthides (Колоквинты) Представляетъ шарообразные бѣлые плоды; отвратительнаго горькаго вкуса. Порошокъ дается въ пилюляхъ какъ сильное проносное средство отъ 1 до 5 gr на пріемъ. Препараты: Tinctura et Extractum

Semina, Семена

Semina Amygdalarum dulcium et amararum, Сладкій и горькій миндаль. Сладкій миндаль служитъ для приготовленія молока Emulsio Amygdalarum dulcium а изъ горькаго перегонкою получаютъ воду Aqua Amygdalarum amararum; изъ обоихъ сортовъ выжимаютъ масло Oleum Amygdalarum.

Sem. Anisi, Анисъ, Мелкія сероватыя семена, ароматнаго запаха, прянаго вкуса; употребляются въ порошкахъ и сборахъ какъ грудное и желудочное средство и входитъ въ составъ Liquor ammoniaci anisati Препар. Oleum Aethereum.

Sem. Cannabis, Конопля употребляется въ видѣ Эмульсій, а

толченыя служатъ для припарокъ; кромѣ того изъ конопли выжимаютъ масло.

Sem. Seu Flosculi Cinae (Цытварное сѣмя). Особеннаго непріятнаго запаха, горькаго вкуса. Порошокъ ихъ дается отъ 10 gr до ʒj натощакъ или просто съ медомъ патокою или въ видѣ кашки съ порошками Папоротника, Ревеня, Мачуна и Ялапы какъ глистогонное средство. Препар: Extr. Cinae и Confectio. Цытварное сѣмя содержитъ въ себѣ Сантонинъ который дается въ порошкахъ отъ 1 и до 3 gr. натощакъ

Sem. Carvi et Sem. Foeniculi Тминъ и Укропъ (первыя мелкiя, вторыя крупныя; сѣро бураго цвѣта. Тѣ и другiя ароматнаго особеннаго запаха пряннаго вкуса. Употребляются въ видѣ грудныхъ и желудочныхъ сборовъ. Препар: Aqua и Oleum Aethereum.

Sem. Lycopodii / Плаунъ / Представляетъ очень мелкій, нѣжный желтоватый порошокъ; употребляется per se или въ смѣси съ магнезіею для присыпки отрѣлостей особенно у дѣтей а такъ же для опсыпанія пилюль. Dening.

S. Lini / Ленъ слизистаго вкуса; изъ цѣльныхъ сѣмянъ приготовляютъ отваръ а толченыя Farina semina Lini

+ служатъ для припарокъ.

S. Sinapis nigrae / Черная горчица бураго цвѣта, употребляется въ порошкѣ для горчичниковъ sinapismus. Эфирное масло горчицы употребляютъ въ смѣси со спиртомъ для втираній при ломотѣ.

Nucis Vomicae / Чилибуха

Представляетъ плоскіе кружки покрытые нѣжными волосками, очень горькаго вкуса; употребляется въ порошкахъ отъ 1/4 до 2 gr.

напріемъ. Препораты Тра которая дается отъ 1 до 10 капель и Extractum назначается до ½ гр. напріемъ. Чилибуха содержитъ въ себѣ Стрихнинъ весьма сильный ядъ.

Secale cornutum / Спорынья Наи-чаще является на колосьяхъ ржи, пред-ставляетъ продолговатыя черныя зерна; Употребляется въ порошкахъ до 5 гр напрі-емъ и въ видѣ наливки отъ ℈j до ʒj на ℥vj колатуры а также входитъ въ составъ кровоостанавливающихъ жидкостей

Amylum tritici / Пшеничный крахмалъ Приготовляется на фаб-рикахъ изъ пшеницы, представляетъ куски различной величины, бѣлаго цве-та. Куски эти легко превращаются въ порошокъ, который въ горячей водѣ раз-бухаетъ, образуя клейстеръ. Крахмалъ Употребляется для клистировъ.

кромѣ того изъ него приготовляютъ декстринъ употребляемый для повязокъ при переломахъ.

Saccharum (Сахаръ) добывается изъ сахарнаго тростника, изъ свекловицы и изъ сахарнаго клена. Сахаръ входитъ въ составъ многихъ лекарствъ для поправленія вкуса и служитъ для приготовленія сиропов.

Gummi Arabicum (Аравійская камедь. Аравійского камедью называется засохшій сокъ акаціи, она представляетъ куски бѣлаго, желтаго и краснаго цвѣта; изъ порошка ея приготовляютъ слизь Mucilago Gummi arabici которая служитъ для соединенія съ водою маслъ, бальзамовъ, камфоры и смолы образуя эмульсіи.

Gummi Resina Ammoniacum/
Аммоніачная камедь или Ам-
моніакъ. Представляетъ желтоватые
куски съ бѣлыми пятнами; запахъ
непріятный, вкусъ горькій. Употребляет-
ся въ видѣ пилюль и эмульсій до 5 gr на
пріемъ какъ возбуждающее дѣйствую-
щее на легкія средства и входитъ
въ составъ пластырей.

Gummi Resina Assae foe-
tidae / Вонючая камедь. Пред-
ставляетъ блестящіе куска бураго
цвѣта; запахъ очень непріятный, вкусъ
отвратительный. Употребляется въ фор-
мѣ пилюль эмульсій и клистировъ какъ
противо судорожное. Препараты:
Trae Assae foetidae.

Gumm. Res. Myrrhae / Мирра

красно бураго цвѣта на ощупь немного
липкна; запахъ пріятный. Употребляется
большею частью только снаружи для по-
лосканій и примочекъ въ видѣ настойки
Tra Myrrhae.

Resina Benzoe. Росный ладонъ
желто бураго цвѣта; весьма пріятнаго
запаха. Изъ роснаго ладона добываютъ
росноладонную кислоту Acidum Benzo-
icum s. flores benzoe которая часто
назначается въ порошкахъ до 5 gr. напр.
какъ отличное отхаркивающее средство

Balsamum Copaivae. Копай-
скій бальзамъ представляетъ проз-
рачную, липкую желтоватую жидкость;
запахъ и вкусъ особенный неприятный.
Часто употребляется per se или въ ва-
дѣ кашекъ и эмульсій около 3i, на
пріемъ какъ противо-перелойное
средство.

Terebinthina communis / Простой Терпентинъ получается изъ простой сосны Pinus особеннаго неприятнаго запаха; входитъ въ составъ пластырей и мазей.

Terebinthina Veneta / Венецiянскiй Терпентинъ / жиже и чище простаго; такъ же входитъ въ составъ пластырей и мазей, а иногда назначается внутрь въ видѣ эмульсiи и пилюль. Столько

Эфирныя и Жирныя масла

Эфирными маслами называются тѣ масла, которые имѣютъ сильный особенный запахъ и летучи. Всѣ они получаются изъ пахучихъ растенiй; густота и цвѣтъ ихъ различный. Жирныя масла получаются такъ же изъ растенiй и большею частью изъ сѣмянъ; въ чистомъ видѣ они безъ цвѣтны и безъ запаха.

Camphora (Камфора) представляетъ бѣлые полупрозрачные куски. Она весьма летуча; въ порошокъ превращается съ прибавленіемъ нѣсколькихъ капель спирта. Запахъ камфары особенный, сильный; вкусъ пряный, согрѣвающій. Употребляется внутрь въ порошкахъ, пилюляхъ, микстурахъ и эмульсіяхъ отъ 1/4 до 3 gr. наприемъ. Препар. Spiritus Camphoratus, Oleum Camphoratum, Acetum Camphoratum и Linimentum Camphoratum; кромѣ того порошокъ камфоры входитъ въ составъ наружныхъ ароматныхъ сборовъ и имъ же посыпаютъ мушки

Oleum Terebinthinae (Скипидарное масло). Неочищенное входитъ въ составъ многихъ наружныхъ средствъ, а очищенное Oleum Terebinthinae rectificatum. Употребляется внутрь въ видѣ эмульсіи около ℈j на ℥vj какъ

мочегонное средство. Скипидаръ растворяетъ смолы гутта-перчу и подобныя вещества.

Oleum Crotonis Tiglii / Кротоновое масло. Получается изъ кротоновыхъ сѣмянъ, имѣетъ густоту не замерзшаго коровьяго масла; запахъ неприятный, вкусъ сильно жгучій. Употребляется внутрь отъ 1/4 до цѣлой капли на приемъ, въ видѣ эмульсій и пилюль какъ сильное слабительное средство; снаружи назначается иногда для втираній какъ сильное и скоро дѣйствующее отвлекающее средство.

Ol. Olivarum / Оливковое масло. Лучшій сортъ Прованское масло назначается иногда внутрь, но большею частью входитъ въ составъ пластырей и мазей какъ и простое деревянное масло.

Ol. Ricini / Клещевинное масло Вынимается изъ сѣмянъ клещевины. Употребляется очень часто внутрь какъ слабительное отъ ʒβ до ʒjj наприм. съ виномъ, кофе а лучше всего съ лимонным сокомъ.

Gallae Turcicae / Чернильные орѣшки. Это суть наросты образующiя на вѣтвяхъ дуба; лучшiй сортъ Азiятскiй; величина ихъ около вишни, серо черного цвѣта, сильно вяжущаго вкуса, употребляется въ видѣ отвара Decoctum Gallarum внутрь какъ противоядiе при отравленiяхъ, а снаружи для вяжущихъ полосканiй и примочекъ. Чернильные орѣшки содержатъ въ себѣ Танинъ Tanninum которое назначается внутрь въ порошкахъ или растворѣ отъ 1. до 4 gr. напр. какъ вяжущ. средство наприм. при поносахъ

Opium | Опій Это есть сокъ получаемый изъ незрѣлыхъ головокъ мака, растущаго въ Азіи; лучшимъ считается Турецкій опій. Онъ представляетъ различной величины куски или лепешки бураго цвѣта, запахъ особенный, одуряющій; вкусъ горькій острый. Содержитъ въ себѣ много составныхъ веществъ. изъ которыхъ особенно важенъ Морфій. Опій употребляется въ порошкахъ и пилюляхъ отъ 1/8 и до 2 gr. на пріемъ; входитъ въ составъ Pulvis Doveri а также въ нѣкоторые пластыри и мази вообще имѣетъ обширнѣйшее употребленіе. Препор. Tra Opii Simplex Tra Opii Crocata. [?] Laudanum Liquidum Sydenhami и Extractum Opii

Morphii назначается обыкновенно

въ видѣ Уксусо-кислаго морфія Morphium Aceticum онъ очень горькаго вкуса растворяется въ водѣ и спиртѣ; дается отъ 1/10 и до 1/4 gr. на пріемъ. Отъ и преимущественно Морфій принадлежатъ къ сильнымъ наркотическимъ средствамъ.

Aloe Сабуръ / есть сокъ вытекающій изъ надрѣзовъ отъ мясистыхъ на листьяхъ растенія того же имени; лучшимъ считается Aloe lucida. Онъ представляетъ бурые въ изломѣ блестящіе куски, порошокъ его желто зеленаго цвѣта. Запахъ непріятный, вкусъ отвратительно-горькій. Сабуръ назначаютъ въ пилюляхъ отъ 1/2 до 2 gr. на пріемъ какъ легкое слабительное и отъ 10 до 20 gr. какъ проносное средство; кромѣ того онъ входитъ въ составъ многихъ сложныхъ лекарствъ Преп. Tra и Extractum

Succus Liquiritiae (Лакрица

Лакрицею называется сгущенный отваръ лакричника; представляетъ длинные черные куски д. сладкаго вкуса; употребляется для поправленія вкуса различныхъ лекарствъ и какъ грудное средство.

B. Царство Животное

Adeps suillus (Axungia porci Свиной жиръ) Очищенный употребляется для втираній и служитъ для приготовленія пластырей и мазей такое же употребленіе и бычачьяго сала sevum bovinum

Lac vaccinum (Коровье молоко) Молоко употребляется какъ питательное средство и составляетъ отличное обволакивающее средство

при отравленіяхъ острыми ядами.
Предоставленное самому себѣ, оно со
временемъ свертывается т.е. густыя
частицы отдѣляются а остается во-
дянистая жидкость.

Сыворотка Serum lactis свер-
тываніе молока дѣлается и искусствен-
но, прибавляя къ нему уксусъ, кремортъ
тартаръ, горчицу или кислое вино. Упо-
требленіе сыворотки составляетъ осо-
бенное сывороточное леченіе; ее назнача-
ютъ отъ 1 до 2 фунтовъ въ день довольно
долгое время

Butyrum Vaccinum Коровье
масло употребляется для нѣкоторыхъ мазей

Cornu Cervi raspatum s. Rasura Cor-
nu cervi Скобленый олений рогъ или
стружки оленьяго рога, употребляют-
ся для приготовленія студени Gelatina
cornu cervi которая назначается иногда
закрѣпляющимъ

Oleum Jecoris aselli (Тресковый жиръ) Получается изъ тресковой печени, цвѣтъ и запахъ различны смотря по сорту жира. Употребляется внутрь и снаружи для втираній при начинающей чахоткѣ и при золотухѣ, особенно у дѣтей отъ чайной до столовой ложки нѣсколько разъ въ день.

Lytta Vesicatorii (Шпанскія мушки) Употребляются сушеныя подъ именемъ (кантаредесъ) запахъ особенный вкусъ ѣдкій назначаются иногда внутрь въ очень маленькихъ пріемахъ какъ мочегонное а снаружи весьма часто для произведенія красноты и пузырей Препораты Гка Emplastrum и Unguentum.

Cera flava, Желтый воскъ, употребляется для цератовъ пластырей и мазей при дѣйствіи солнечнаго свѣта и сырого воздуха получается бѣлый воскъ Cera alba который чище плотнее и неимѣетъ запаха

Mel, Медъ, очищенный медъ Mel depuratum употребляется для подслащенія кромѣ того изъ него приготовляютъ Mel rosatum розовый медъ охутель Scillae кислочмедъ и охутель simplex

Acida, Кислоты

Кислоты раздѣляются на минеральныя и растительныя; въ малыхъ пріемахъ они прохлаждаютъ и уменьшаютъ жаръ и жажду и увеличиваютъ отдѣленіе мочи въ большихъ

пріемахъ крѣпкія кислоты acida con-
centrata дѣйствуютъ ѣдко и про-
изводятъ воспаленіе, а потому наз-
начаются только снаружи для при-
личаній для внутренняго же употреб
ленія разводятся водою и называются
acida dilиta водою называются

Acidum Sulphuricum concentra-
tum s. Oleum Vitrioli Крѣпкая
сѣрная кислота или купоросное
масло, представляетъ безцвѣтную
очень ѣдкую жидкость на кожѣ произ-
водитъ жженіе и окрашиваетъ ее въ жел-
то кирпичный цвѣтъ употребляется
только снаружи: разведенная водою
acidum sulphuricum dilutum дается
внутрь до 10 капель на пріемъ. Смѣсь
одной части крѣпкой сѣрной кислоты

съ тремя частями спирта назы-
вается Elixir acidi Halleri Гал-
лерова кислота, которая назначает-
ся въ такихъ же пріемахъ.

Acidum Nitricum Азотная
или селитренная кислота пред-
ставляетъ дымящуюся жидкость
желтаго цвета въ прикосновеніи ра-
съ кожею разрушаетъ ее производя по-
мертвеніе. Употребляется для при-
жиганій особенно сифилитическихъ язвъ
и наростовъ: разведенная водою aci-
dum nitricum dilutum назначается
внутрь отъ 5 до 10 капель на пріемъ какъ
прохлаждающее при цынготномъ и
меркуріальномъ худосочіи.

Acidum Nitrico muriaticum s.
aqua Regia Царская водка

состоитъ изъ одной части азотной и двухъ частей соляной кислоты мгс-тно она дѣйствуетъ сильнѣе всѣхъ другихъ кислотъ употребляется только для ножныхъ ванъ. только

Acetum crudum, Уксусъ, получа-ется при брожении пива вина и солода въ медицинѣ употребляется винный уксусъ acetum vini запахъ и вкусъ осо-бенные употребляется внутрь и сна-ружи. Изъ него приготовляютъ Oxy-mel simplex кисло медъ acetum aro-maticum Ароматный уксусъ acetum Camphoratum камфорный уксусъ

Succus citri, Лимонный сокъ Выжимается изъ свѣжихъ лимоновъ Употребляется въ видѣ лимонада какъ кисловатое прохлаждающее питье

Лимонный сокъ и вообще лимоны составляютъ отличное противоцынготное средство. Tartar

Acidum Tartaricum Винно каменная кислота. Находится во многихъ плодахъ и ягодахъ наприм: въ винограде представляетъ подобно другимъ кислотамъ кр. прозрачные куски действуетъ подобно другимъ кислотамъ. При выдерживанiи вина получается винный камень Кremor tartari s. kali bitartaricum; очищенный и превращенный въ порошокъ употребляется какъ прохлаждающее 3β напр. и какъ легкое слабительное 3β напр.

Спиртные и Эфир. лiкер.

Alcohol s. Spiritus Vini Винный спиртъ получается перегон-

кою изъ нѣкоторыхъ веществъ напр:
ржи картофеля и другихъ покрѣпос-
ти различаютъ, Spiritus vini recti-
ficatus, 60. Spir. vini rectificatissi-
mus "80" и Spir. vini alcoholisatus
95°! Эти сорты служатъ для при-
готовленія настоекъ и для раство-
ренія нѣкоторыхъ лѣкарствъ а такъ
же для наружнаго употребленія внутр-
ше назначаются спиртныя напитки
водку вино и пиво.

Опит: Вино: Получается посред-
ствомъ броженія изъ виноградного сока.
По способу приготовленія вина получа-
ютъ и свое названіе крѣпость винъ
различна. Съ медицинскою цѣлью ви-
но назначается въ небольшихъ пріемахъ
какъ возбуждающее средство

Cerevisia (Пиво) хорошее пиво
полезно для истощенныхъ малок-
ровныхъ но съправильнымъ пищеваре-
вареніемъ въ обыкновенномъ простомъ
пивѣ содержится очень мало спирта
около 1% одуряющее же дѣйствіе зави-
ситъ отъ присутствія въ немъ хмѣля

Эфирами называются особенные
безцвѣтные жидкости. Онѣ весьма
летучи и легко воспламеняются
и имѣютъ сильный запахъ полу-
чаются перегонкою спирта съ нѣко-
торыми кислотами. Отъ взятой
кислоты и эфиръ получаетъ свое наз-
ваніе Напримѣръ Сѣрный эфиръ
Уксусный эфиръ и проч.
Чаще другихъ употребляется сѣр-
ный эфиръ Aether sulfuricus

онъ дается отъ 5 до 10 капель нару:
кромѣ того онъ служитъ для раство-
ренія смолъ маслъ камфоры и дру-
гихъ веществъ. Смѣсь одной части
сѣрнаго эфира съ тремя частями
спирта даетъ Liquor anodinus Hoff-
manni котор. назнач. до 30 капель нару:

Chloroformium Хлороформъ

Представляетъ безцвѣтную весьма
летучую жидкость эфирнаго запаха
сладенькаго вкуса хлороформъ иногда
назначается внутрь по нѣсколько
капель а снаружи въ видѣ втира-
ній для унятія болей обширное же
употребленіе онъ имѣетъ при произ-
водствѣ операцій человѣкъ вдыхая
его приводится въ безчувственное
состояніе анестезія

Царство Ископаемое

Chlorum Хлоръ есть газъ желто зеленаго цвѣта удушливаго запаха, получается изъ поваренной соли употребляется для очищенія воздуха и для вдыханія при нѣкоторыхъ страданіяхъ легкихъ обыкновенно же онъ употребляется въ видѣ aqua chlori / aqua oxymuriatica т. е воды насыщный хлоромъ она желтаго цвѣта особеннаго запаха отъ свѣта портится aqua chlori часто назначается какъ противогнилостное при тифѣ и кровяномъ поносѣ отъ ʒij до ʒjv на ℥vj Mixturae а снаружи для полосканія.

Chloretum calcis Хлорная известь употребляется въ растворѣ для очищенія язвъ

Iodum Iодъ Представляетъ блес-
тящiе чешуйки стальнаго цвѣта за-
пахъ похожъ на запахъ хлора, вкусъ не-
прiятный кожа окрашивается iодомъ
въ желто-кирпичный цвѣтъ. Iодъ при-
надлежитъ къ лучшимъ разрѣшающимъ
средствамъ и имѣетъ огромное упот-
ребленiе въ медицинѣ обыкновенно
въ видѣ iодной тинктуры Trae
Iodi отъ 5 до 10 капель напрiемъ
Тинктуру эту также иногда съ
пользою даютъ при упорной лихорад-
кѣ 3 или 4 раза въ день. Iодъ соединя-
ется съ кали и образуетъ бѣлую соль
Kali Hydrojodicum /. Kali Iodatum
iодистый потассiй которая дается
внутрь около 5 гр. напрiемъ въ растворѣ.
а снаружи въ видѣ мази при хроничес-
кихъ "Азвахъ" опухоляхъ

Sulfur Сѣра. Очищенную сѣру
или сѣрные цвѣты Flores sulfuris
назначаютъ въ порошкахъ около 10 gr на
пріемъ какъ разрѣшающее и слабительное
средство при геморроѣ а снаружи сѣра
употребляется при чесоткѣ и другихъ
болѣзняхъ кожи въ видѣ мази Unguen-
tum sulfuratum. Сѣра въ соединеніи
съ кали даетъ сѣрную печень Kali
sulfuratum s. hepar sulfuris упо-
требляется иногда внутрь а чаще сна-
ружи для ваннъ около ℥ij
Phosphorus Фосфоръ Представ-
ляетъ бѣлое горючее въ темнотѣ свѣ-
тящееся тѣло получаемая изъ костей
и въ видѣ палочекъ сохраняется въ водѣ
запахъ противный Употребляется какъ
средство возбуждающее нервную

систему внутрь до 1/4 др. а снаружи въ видѣ мази.

Carbo animalis et Carbo Ligno-rum Животный и древесный уголь Первый получается пережиганіемъ костей и мяса а второй дерева оба а преимущественно животный уголь имѣетъ свойство изменять запахъ и цвѣтъ различныхъ [illegible] костей древесный же уголь часто употребляется для присыпки гнилостныхъ язвъ и для зубныхъ порошковъ.

Argentum, Серебро. Въ медицинѣ серебро употребляется въ видѣ азотно кислаго серебра его два вида Argentum nitricum, cristalisatum, которое представляетъ прозрачную соль и argentum nitricum fusum s lapis

Infernalis адскій камень которое представляетъ бѣлые полупрозрачные палочки первое употребляется внутрь въ пилюляхъ до ¼ гр. на пріемъ при нервныхъ болѣзняхъ и при хроническихъ поносахъ второе имѣетъ обширное употребленіе снаружи для прижиганія различныхъ наростовъ, язвъ и для глазныхъ примочекъ ляписъ и его растворъ должно защищать отъ дѣйствія свѣта.

Hydrargyrum Vivum s. Mercurius

Ртуть. Ртуть есть блестящій бѣлаго цвѣта жидкій металлъ отъ сильнаго нагрѣванія онъ превращается въ пары. Въ металлическомъ видѣ ртуть дается иногда внутрь только при заворотѣ кишекъ соли же ея имѣютъ обширное употребленіе въ медицинѣ; онѣ назначаются внутрь и снаружи какъ разрѣшающее

противо воспалительные и противо сифилитическія средства. Нѣкоторые изъ нихъ имѣютъ весьма сильное дѣйствіе вообще же при продолжительномъ употребленіи ртутныхъ препаратовъ появляется обильное слюнотеченіе, salivatio, поражаются десна и слизистая оболочка рта и наконецъ происходитъ меркуріальное худосочіе обнаруживающееся разстройствомъ всего организма металлическая ртуть часто назначается въ видѣ сѣрой мази Unguent. Hydrar. cinereum и пластыря Emplast. Hydr.

Calomel s. Chloretum Hydrargyri Каломель или хлористая ртуть или сладкая ртуть, Представляетъ тяжелый желтовато бѣлый порошокъ безъ вкуса въ водѣ

и спиртѣ не растворимъ назначается внутрь въ маленькихъ пріемъ около 1 gr какъ разрѣшающее и противо воспалительное а въ большихъ около 5 gr какъ слабительное. При употребленіи каломели должно избѣгать хлорной воды и очень соленой пищи и нашатыря

Mercurius Sublimatus corrosivus s. Bichloretum Hydrargyri

Сулема или двухлористая ртуть Это есть бѣлаго цвѣта непріятнаг вкуса весьма ядовитая соль растворяется въ водѣ и спиртѣ дается внутрь съ большею осторожностію на тощее въ пилюляхъ до 1/2 части gr на пріемъ какъ напримѣръ Pilulae Dzondianae. При отравленіи сулемой должно поддерживать рвоту и з а[illegible]

обильнымъ питьемъ слизистой жидкости а потомъ давать яичный бѣлокъ и молоко растворъ каломеля въ известковой водѣ Aqua fagadenica nigra а сулемы Aqua fagadenica flava назначаются для перевязокъ сифилитическихъ язвъ.

Hydrar. Jodatum s. Hydrar. Biiodatum. Это суть соединеніе ртути съ Іодомъ первое желтаго цвѣта назначается внутрь въ пилюляхъ до ¼ gr. на пріемъ второе краснаго цвѣта употребляется снаружи въ видѣ мази.

Mercurius Precipitatus ruber Красная окись ртути. Употребляется внутрь до ¼ gr. на пріемъ въ порошкахъ и пилюляхъ а снаружи въ видѣ мази и для присыпки сифилитическихъ язвъ

Antimonium s. Stibium. Сурьма
Представляетъ особенный, хрупкій серебристаго цвѣта металлъ. Sulfur antimonii rubrum s. Kermes mineralis. Красно сурьмяная сѣра или минеральный кермесъ и Sulfur antimonii auratum. Желто сурьмяная сѣра. Первая представляетъ красно бураго цвѣта порошокъ, а вторая оранжеваго; употребляютъ въ порошкахъ отъ 1/4 gr. 2хъ гр. напримѣръ при грудныхъ болѣзняхъ чтобы увеличить отдѣленіе мокротъ. [illegible]

Tartarus stibiatus s. Tartarus Emeticus. Рвотный камень бѣлаго цвѣта непріятнаго вкуса легко растворяемая въ водѣ. Рвотный

камень дѣйствуетъ различно, смотря
по величинѣ прiема; какъ рвотное его
даютъ отъ 1 до 3 др. на прiемъ и большею
частью съ прибавленiемъ рвотнаго
корня въ порошкахъ или въ микстурѣ;
какъ отхаркивающее или потогонное
отъ 1/12 до 1/4 др. При употребленiи его осо-
бенно въ большихъ прiемахъ, не рѣдко
поносъ, а отъ очень большихъ прiемовъ
напр. (Ʒj, или Ʒß) происходитъ воспаленiе
желудка и кишекъ вслѣдствiе этаго
моментъ и смерть. При отравленiи дол-
жно поддерживать рвоту обиль-
нымъ тепловатымъ слизистымъ
питьемъ а потомъ даютъ отваръ хинной,
или чернильныхъ орѣшковъ или же
крѣпкiй настой чая. Растворъ
двухъ гранъ рвотнаго камня

въ одной унцiи мадеры Vinum Stibiatum дается внутрь смотря по возрасту больнаго. Рвотный камень также употребляется и снаружи въ видѣ пластыря или мази Emplastrum et Unguentum Stibiatum. Послѣ которыхъ появляются на томъ мѣстѣ пустулы болящiя похожiя на оспу.

Acidum Arsenicosum s. Arsenicum s. Arsenicum album

Мышьяковистая кислота или бѣлый мышьякъ Представляетъ куски, похожiя на стекло или фарфоръ иногда молочнаго цвѣта, вкусъ сначала немного острый а потомъ сладковатой, запаха не имѣетъ но образующiя при накаливанiи имѣютъ чес-

ночный запахъ. Употребляется въ растворѣ Solutio Arsenicalis Fowleri отъ 4 до 8 капель натощакъ два или три раза въ день при лихорадкѣ а снаружи какъ едкое и раздражающее средство. 90 капель этаго раствора содержитъ одинъ гранъ мышьяковистой кислоты. Мышьякъ принадлежитъ къ сильнѣйшимъ ядамъ.

Plumbum aceticum oxydatum s. Saccharum Saturni Уксусно кислый свинецъ или свинцовый сахаръ. Представляетъ бѣлые чешуйки вяжущаго вкуса; употребляется въ порошкахъ отъ 1/2 до 2 gr. натощакъ съ опiемъ а еще лучше съ морфiемъ при упорныхъ поносахъ а снаружи назначается для вспрыскиванiй и глазныхъ примочекъ

Extractum Saturni s. Acetum Plumbi) Свинцовый уксусъ употребляется только снаружи для примочекъ въ видѣ Aqua Saturni Aqua Goulardi есть также свинцовая вода только съ прибавленiемъ спирта.

Cuprum Медь. Металлическая медь свѣтло краснаго цвѣта, тренiемъ въ рукѣ сообщаетъ ей непрiятный запахъ. Медь растворяется въ кислотахъ и образуетъ различныя соли, изъ которыхъ нѣкоторыя иногда употребляются внутрь а большею частiю только снаружи какъ ѣдкое или лечащее средство.

Cuprum sulphuricum s. Vitriolum „coeruleum" Ceruleum. Сѣрнокислая медь или синiй купоросъ употребляется какъ рвотное отъ ½ до 4 др.

въ порошкахъ или растворѣ а чаще снаружи для прижиганій

Cuprum aceticum crystallisatum

Уксусо кислая мѣдь или ярь мѣдянка представляетъ темно зеленые кристаллы вяжущаго вкуса; употребляется только снаружи

Cupr. aluminatum s. lapis divinus

Мѣдные квасцы. Употребляются снаружи какъ ѣдкое средство и для глазныхъ примочекъ. Мѣдные препараты принятые внутрь въ большомъ количествѣ, дѣйствуютъ какъ сильные яды. При отравленіи должно поддерживать рвоту и затѣмъ давать молоко и бѣлокъ.

Ferrum s. Mars. Желѣзо. Представляетъ особенный ковкій металлъ

растворяющееся въ кислотахъ и образующiй различные кислоты. Желѣзо составляетъ одну изъ главныхъ частей крови и служитъ превосходнымъ укрѣпляющимъ средствомъ.

Ferrum pulveratum s. Limatura martis желѣзныя опилки, употребляется въ порошкахъ или пилюляхъ до 4 др. на прiемъ.

Fer. Jodatum. Jодистое желѣзо. Этотъ препаратъ трудно сохраняется, а потому чаще назначаютъ его соединенiя съ сахаромъ Fer. Jodatum saccharatum и syrupus ferri Joda[ti]. Перваго даютъ до 3 др. а втораго до 30 к.

Fer. Carbonicum Углекислое желѣзо назначается въ порошкахъ

или пилюляхъ до 2 gr. на прiемъ. Кромѣ того оно употребляется въ формѣ естественной или искуственной минеральной воды.

Ferrum Sulphuricum cristallisatum s. Vitriolum viridae. Сѣрнокислое желѣзо или зеленный купоросъ. Представляетъ зеленые кристаллы легко растворимые въ водѣ; употребляется внутрь до 3 gr. на прiемъ, а снаружи для вяжущихъ полосканiй, вспрыскиванiй.

Ammonium muriaticum ferriginosum s. Flores "Sulphuris". Salis ammoniacj martialis. Желѣзистый Нашатырь. Употребляется внутрь до 5 gr. на прiемъ.

Tinctur. Tonico nervina Bestuschevj. Бестужевскiя капли. Содержатъ

въ себѣ хлористое железо дается внутрь до 20 капель на пріемъ
Ferr. Hydrocianicum Ціанистое железо употребляется при упорной лихорадкѣ около 3 гр. на пріемъ.
Globuli martiales Стальные шарики Состоятъ изъ виннаго камня и железныхъ опилокъ, вѣсомъ около ℥i употребляются отъ 2 до 4 штукъ для ванн.
Zincum Цинкъ Представляетъ металлъ синевато сѣраго цвета. Цинковые препараты часто употребляются внутрь только какъ рвотное и иногда какъ противосудорожныя; снаружи какъ вяжущія или какъ ѣдкая средства.
Zincum Oxydatum s. Flores zinci Окись цинка а снаружи употреб-

ляется внутрь около 1 гр. наприемъ
а снаружи въ видѣ мази.

Zincum aceticum Уксусокислый
цинкъ Назначается внутрь около
2 гр. напр. а снаружи для вспрыскиванiй

Zincum sulfuricum s. Vitriolum
album Сѣрнокислый цинкъ или
бѣлый купоросъ Назначается въ
растворѣ какъ рвотное около 5 гр. напр.
снаружи для глазныхъ примочекъ око-
ло 1 гр. на ℥j воды

Bismuthum Висмутъ Употреб-
ляется въ медицинѣ въ видѣ азотно
кислаго висмута Bismuthum nitricum
s. Magisterium Bismuth. который
назначается внутрь до 5 гр. наприемъ
въ порошкахъ при поносахъ.

Alumen Квасцы Приторна

вяжущаго вкуса употребляются внутрь въ порошкахъ или растворѣ около 5 gr. наприемъ при свинцовой коликѣ до ʒj напр. При накаливании получаются жженые квасцы Alumen ustum которые употребляются для полоскании и для примочекъ какъ вяжущее средство

Magnesia usta, Магнезия Представляетъ бѣлый очень легкий нерастворимый въ водѣ порошокъ. Съ нѣкоторыми кислотами образуетъ соли напримѣръ. Magnesia sulfurica s. sal anglicanum Английская соль назначается какъ слабительное отъ ʒß до ʒj напр.

Calcaria s. Calx Известь находится въ природѣ въ видѣ углекислой извести какъ напримѣръ мраморъ или мѣлъ при обжигании получается жженая известь Calcaria usta

которая въ видѣ извѣстковой воды
Aqua Calcis назначается внутрь до
℥iii обыкновенно съ коровьемъ молокомъ смѣшав
извѣстковую воду съ деревяннымъ
или льнянымъ масломъ поровну по-
лучается Linimentum Calcariae упо-
требляется при ожогахъ
Kali ſ. Potassa Kali или поташ
сь получается изъ обыкновенной
золы въ видѣ углекислаго кали кото
рое неочищенное извѣстно подъ именемъ
продажнаго поташа Cineris Clavela-
ti и употребляется только для ванн
Очищенное Kali Carbonicum назна-
чается внутрь въ микстурахъ и изъ
него приготовляютъ Potio Riveri
Rp Kali Carbonici
Succus Citri
aq. Destillat.
Syrupi Simplecis

Kali causticum ѣдкое кали упо-
требляется обыкновенно для прижи-
ганій подъ именемъ lapis causticus chi-
rurgorum, который въ смѣси съ ѣдкою
известью даетъ Венскій ѣдкій порошокъ
Pulvis causticus Viennensis употребляет-
ся въ видѣ пасты Pasta Viennensis.
Kali nitricum Селитра Пред-
ставляетъ соль бѣлаго цвѣта солена-
го вкуса употребляется въ микстурѣ
какъ прохлаждающее около 10 др. на фунтъ
кромѣ того селитра входитъ въ составъ
нѣкоторыхъ примочекъ напримѣръ въ
Fomentum Schmucheri
Natrum s. soda Натръ или со-
да получается въ видѣ углекислаго
натра изъ золы приморскихъ растеній
Соли натра дѣйствіемъ похожи на

на соли Kali, но слабѣе, а легко пере-
носятся желудкомъ и нерасплавливаю-
щаяся на воздухѣ. Natrum Carbonicum
et Bicarbonicum дается въ порошкахъ
или растворѣ около 10 gr наприемъ. Nat-
rum Bicarbonicum служитъ для сос-
тавленія шипучихъ порошковъ которые
состоятъ изъ него и винно каменной
кислоты ~~Acidum~~ Tartaricum
Natrum Sulphuricum s. Sulfas
Sodae глауберовая соль употреб-
ляется какъ слабительное отъ ℥ß до ℥I
Natrum Muriaticum Пова-
ренная соль входитъ въ составъ
нѣкоторыхъ примочекъ.
Ammonium Аммiакъ Есть
газъ остраго проницательнаго
запаха, легко поглощается

водою; употребляется въ видѣ Liquor ammonii caustici Нашатырный спиртъ обыкновенно снаружи для втираній и какъ нюхательное средство иногда и внутрь по нѣсколько капель какъ возбуждающее. Смѣсь одной части нашатырнаго спирта съ четырьмя частями деревяннаго масла даетъ Liniment ammoniatum s. Liniment. Volatile а съ прибавленіемъ Комфары Linimentum ammoniatum Camphoratum. Амміакъ входитъ въ составъ многихъ лекарствъ напримѣръ Liquor ammonii anisatus дается до 20 капель на пріемъ какъ отхаркивающее средство; Liquor ammonii aceticus s. Spiritus Minderery дается отъ ℥i до ℥ii на ℥vi микстуры какъ потогонное.

Ammonium Carbonicum s. Sal volatile. Летучая соль дается въ порошкахъ или растворѣ до 5 gr какъ возбуждающее дѣйствующее на легкія средство.

Ammonium muriaticum. Нашатырь назначается въ микстурахъ около 5 gr какъ разрѣшающее, а также при лихорадкѣ.

Rp. Dec. Chinae [illegible] ℥vj
Elaeosacchari Menthae ʒj
M. D. S. принимать
черезъ 2 часа по столовой
ложкѣ отъ лихорадки
Nev Amer [illegible]

Rp. Liquor. ammonii succinat. ʒii Opii puri gr. iii Ext. Hyoscyami gr. iii	2 раза въ день по 30 капель при кровавомъ поносѣ
Rp. Oxymel. Hydrargyr. gr. iv solve in Ext. Hyoscyami ℈i Mellis despumati ℥ß	Для смазыванія венерическихъ язвъ въ полости рта.
Rp. Zincum sulphuric. gr. iii solve in Aq. Destillata ℥iii adde Aq. lauro cerat. ʒiii Trae Opii simplecis ʒß	Употреблять теплое для вспрыскиванія при хроническомъ перелоѣ
Rp. Balsami Copaivae Syrupi flor. aurant. Aq. menthae piperit. Spir. vini rectificat. aa ʒß Aq. flor. aurant. ʒii D. S.	При перелоѣ два или три раза въ день по ло[...]

℞ Pf. Bac. Juniperi ℥iv
Oitel. Ov. ℥i.
Bals. Terebinth. ʒii
Oxymel Scillae ʒii
Ext. Hyoscyami gr. vi
M. f. Mixtura
adde
Aether. Sulfur. ʒi
Pulv. Camphorae gr. vi
M. D. S.

℞ Glycerin. ℥i et Semi
Aq. Flor. Sambuci (?) ʒiii
M. D. S.

℞ Liniment. am. ʒs.
Ung. Mercurial. ʒii
Olei Hyosciami
M. f. Unguent.

℞ Elixir acid. Hall.
Aq. lauro cerasi aa ʒ.

Принимать

четыре

ложки

въ день

Примочка

Отъ шанкра

Мазь для

втираній въ

появляющій

бубонъ

при кровохар-

каніи

Rp. Creosoti gtt. ij Spir. vini rect. ℥ij Trae Menthae piper. ℥i Opii crocatae ℈ß M. D. S.	Капли при зубной боли
Rp. Ptj Althaeae ℥vj Tartar. emetici gr. iij Trae opii simplicis ʒß Syrupi simplicis ℥i	Употреблять при бане через два часа по ложке
Rp. Ext. ~~amar.~~ amarum ℥ß Sulf. chinini ʒß Salis ammoniaci ʒij aq. destillat. ℥vj acidi sulfur. dilut. q. s.	каждое утро по полчашки от за- старелой лихорад- ки.
Rp. Sarsaparillae Stipites dulcamari R. liquiritiae — Graminis aa ℥i Lignum Guajaci ℥ij Semina Seniculi ʒij	против ломоты членов и венериче- ской болезни варить с 2мя фунтами воды до тех пор, пока получится 1 ф. принимать через 2 ч. по ложке

Rp. Chloret. Calcis ℥s Carbo Lignori ℥s Pulvis Cortex Chinae Pul. Irid. Florent. ℥s	Чистить десна для истребления вонючаго запаха.
Rp. Irac opii ʒi Valerianum aether ʒii Vini Ipecacuanhae ʒii Essentia Menthae ℥s M. D. S.	Употребляють приноносъ и рѣзи живота съ виномъ или на сахаръ.
Rp. Pul. Filicis maris ʒis Extract. F. m. gr. xx. Mellis communis ℥s.	На два пріема противъ глистовъ.
Rp. Aloe Lucid pul. ʒii. assae Fetid depu. ʒis непунан Ferri Sulphurici exiot. pul. ʒiii. Croci pul. Macedis pul. aa gr. xx Olei Succini gutt. xx Syrupi croci q. s. ut f. pilul. gr. iii. Consperg pulveis croci	Давать постепенно увеличивая отъ 2 до 4 и до 8 пилюль Венедиктов противъ упорнаго затвердѣнія. ить сличная кровей

Rp. Kalij Jodati gr: x.
Jodi puri gr: j.
Aq. Lauro cerasi ℨ ij.

4/ Rp. Sulphuris aurant. Antimonii
Pulvis Ipecacuanhae aa gr. s.
Ext. Hyosciami gr. unum.
Sacchari grana decem.
Misce fiat Pulvis, dentur
tales doses № 19 d. s.
4 раза въ день по порошку
при кашлѣ.
2 Rp. Chini Sulphurici gr. d.
Sacchari grana x. M. f.
d. S. D. N. 4 d. s.
по порошку предъ пароксиз-
момъ при лихорадкѣ.
5/ Rp. Sulphatis Chinini
Ferri carbonici aa gr. v.
Pulveris Aromatici ℨ j.
m. f. P. divid. in partes
aequales N. 12 d. s.
~~Порошки укрѣп~~

три раза въ день
по 10 капель при
желтухѣ и воспале-
ваніе.

по 3 порошка
въ день.
Порошки
Укрѣпляющіе
при малокровіи

4 Rp. Tartari emetici gr. unum.
Pulvis Ipecacuanhae gr quindecim.
M. f. P. D. T. D. N. 2 S.
Рвотные порошки.

5 Rp. Calomelani gr quinque.
Pulvis Jalappae gr decem.
M. f. P. D. t. D. N. 2 d. s.
Как сказано слабительные порошки

Rp. Radicis Althaeae
Liquiritiae aa ℥ unum.
Iridis florentinae ℥ semis
florum Verbasci ℥ unum.
Seminum Anisi drachmas duae.
Concise contuse. m. f. Species
pro thee грудной чай.

Rp. Corticis Chinae
Radicis Gentianae aa ℥ semis
Corticis Cinnamomi
Cardamomi aa ℥ unum.
Concise contuse, m. f. Species pro
infuso ароматном сборе.

Кашка.

Rp. Pulpae prunorum drachmas duas.
Rad. Sambuci ʒ tres
Pulveris Sennae
Cremoris tartari aa ʒ tres
Mellis despumati q.s. ut f. l. artis
electuarium D.S.
Через 2 часа по чайной ложке
Слабительная кашка.

Rp. Seminis Cinae ʒ duas.
Radicis Valerianae
— Jalapa aa ʒ unum
Mellis despumati q.s. f. electuarium D.
Каждое утро по чайной ложке
Глистогонная кашка.

Пилюли.

Rp. Pulveris Scillae
— Digitalis
Gummi arabici aa ʒ semis
Saponis medicinalis ʒ j
Balsami Copaivae q.s. ut fiat massa
pilularis ex qua formentur Pilulae
grana duae conspergere Pulvere lycopodii
D.S.

Утромъ и вечеромъ по 3 пилюли.
Мочегонные пилюли при водянке.

Rp. Chini Sulphurici grana quindecim.
Pulvis ci

Rp. Trae Croci
— " — Ipecacuanhae aa ʒij
— " Opii ʒβ
— " Lobeliae inflant. ʒj MDS
Два раза въ день по 15 капель

Rp. Trae castorei
Spirit. cornu cervi aa ʒiij
Aetheris sulphurici ʒj
M. D. S. Принимать по 30-40
въ одной чашке Inf. flor. chamomi.
отъ трудного отделения
месячной крови

Роспись

Сильно-дѣйствующимъ лекарствамъ съ означеніемъ самаго высшего ихъ пріема для взрослыхъ

Наименованіе средствъ	Грон.	Коп.
Acetum Digitalis ...	—	20.
Acidum arsenicosum	1/20	
...... hydrocianicum	—	1.
.... Muriaticum	—	20
.... Nitricum	—	20
... Sulphur. dilut.	—	30
Aconitum	1/10	—
Aether sulphuris nitr. acet.	—	30
.. phosphoratus	—	10
Amigdalinum	2	—
Aq. Amigdal. amar.	—	50
.. Laurocerasi	—	30

Наименованіе средствъ.	Гран.	Кап.
Argentum nitricum	1/2	—
Atropinum —	1/10	—
Auro-Natrium chlorat.	1/4	—
Bromum (Лития) - - - -	1/4	—
Brucinum — -	1/5	—
Cantharides pulv.	1.	—
Chlorophorminum	—	5.
Colocynthides pulv.	3.	—
Cuprum sulphur. Amm.	1/2	—
При продолжит. употр.	6.	—
Cuprum sulphur. —	1	—
какъ рвотное —	—	—
	8.	
въ нѣсколькихъ —	—	—
пріемахъ —	—	
Digitalinum - -	1/20	—
Ext. Aconiti (Alcoholicum)	1/2	—
— Belladonnae —	2	—

... Colocynthidis 1. —
... Coniimacul. alcohol. 5. —
— — Digytalis — 2 —
— Helebori nigri 10 —
— Hyoscyami — 3. —
— Lactucae virosae 10 —
— Nucis vomici 3. —
— — — Alcohol. 1/2 —
— opii — 2 —
— pulsatillae 2 —
— Sabinae — 3 —
— Scillae — 5 —
— Secalis cornuti 5 —
— Stramonii 1. —
Ferrum Jodat. Saccharat. 10 —
Folia Aconitii pulv. 5 —
— Belladonnae 6 —
— Conii maculati 5 —

Fol. Digitalis — 3. —

Hyoscyami — 5 —

Sabinae — 20 —

Stramonii — 2 —

Fol. Toxicodendri — 6 — —

Gummi guttae 2 —

Hydrargyrum acet. 1. —

— bijodatum rubr. 4/6 —

— — cyanatum 1/4 —

" " Jodatum flav. 2 —

— Muriat. corrosiv —

— bichloratum 1/8 —

" " oxydat. rubrum 1/2 —

" " oxydulat. nig. 3. —

Jodum въ соединеніи

съ іодистымъ

— потасіемъ 1/2 —

	Г.	Д.З.
Kreosotum	. . .	
Lactucarium . . .	5	—
Liquor. arsen. Fowleri	—	5
Morphium Acet. et mur.	1/4	—
При продолжитель-		
номъ употреблении	2	—
~~Nitricum~~ —	~~1/20~~	—
Nicoticum —	1/20	—
Nucis vomice pulv.	2 —	—
oleum Amigd. amar.	—	1.
— Crotonis aether. — —	—	2
— Sabinae —	—	1.
opium	2.	. .
phosphorous . . .	1/8	
Plumbum Aceticum	2.	—
depuratum —		
Pulv. Ipecacuanh.	—	20.
opiatus (pulv.)	—	
Doveri		

	T.	Kor.
Radix Belladonnae	8.	—
" Hellebori albi	8.	..
" " nigri "	10	—
" Scillae "	3.	..
Scammonium —	20	..
Secale cornutum	20	..
Semina conii macul. pulv.	4	..
" Hyoscyami pulv.	4	..
" Stramonii pulv.	4	..
Tartar. Stibiatus —	8	..
Strychninum aceticum	1/10	1/10.
Tinct. Cantharidum	—	10.
" Colocynthid.	—	10
" Conii maculati	—	20
— — Digitalis aeth.	—	15.
[illegible]		[illegible]

	Ф.	Коп.
Tinct. Nucis vomicae ..		10
" " opiati Crocati ..		20
" " " " Simplicis ..		20
" " pulsatillae (изъ (свѣжего растенія)		
Tinct Seminum Stramonii ..		20
Veratrinum	1/10	—
Vinum rad. Colch. —		20
— Seminum Col. —		30
— Ipecacuanhae —		60
Zincum Chloratum	1/8	
" " Cyanatum (sine Ferro)	1/4	—
" " Sulphuricum purum	1	
Корн. рвотное въ мелкост.		
премиалъ дз — 10.		

Объясненіе

С Латинскаго названія на русской переводъ

№ по порядку	Латинское название	Русское название
1.	Febris intermittens	Перемежающаяся лихорадка
2.	— Remittens	—
	Rp. Liquor Anodini Aeth. Acetici aa ʒij Ol. Caryophillor. gtt. X Morphii Acetici gr. I M. D. S. Капли для зубов Освежающее средство	Rp. Morphii muriat. gr. I Sacchar. albi ʒj M. f. p. div. in [illegible] Rp. infus flor tiliae ʒiv Syrup. Sacchar. [illegible] ʒIII через 2 ч. по десерт. ложке

Acetum aromaticum

Ароматный уксус

Rp. Листьевъ розмарина (Foliorum Rosmarini
Листьевъ шалфея Foliorum Salviae
" перечной мяты Folio. Menthae piperitae
Цвѣтовъ лаванды Florum Lavandulae
Корицы Corticis Cinnamomi Cassiae каждаго по унцiй
Лимонной корки (Corticis Citri ℥β
Гвоздики (Caryophyllorum ʒij
Уксуса Aceti ℔ x

Снаружи для втиранія и окуриваній

Rp. Balsam copaivae ʒiij
— Peruvianae ʒj
Spiritus Nitri dulcis ʒj
T-rae Scillae ʒβ

принимать по 10 капель два раза въ день отъ перелоя

Tinctura Absinthii.

Настойка полыни.

Rp. Травы полыни (Herbae Absinthii ℥3

Очищеннаго спирта 70% Spiritus vini rectific. ℥iij

M. D. S. Внутр: отъ 30 до 60 капель на прiемъ.

Tinctura Aconiti

Настой травы аконита.

Rp. Травы аконита Herbae Aconiti ℥3

Очищеннаго спирта 70% Spirit. vini rect. ℥iij —

Мелко изрѣзанный аконитъ настаиваютъ съ спиртомъ въ закупоренной стклянкѣ въ продолженiи 8-й дней, часто взбалтывая; за тѣмъ жидкость сливаютъ и, выжавши въ нее остатокъ, процѣживаютъ через пропускную бумагу. Получается два фунта и пять унцiй прозрачной настойки,

зелено-бураго цвѣта, горькаго вкуса.

У. Внутрь: по 5—10—20 капель на прiемъ

Tinctura Aloës

Настойка сабура.

℞ Сабура Aloës ℥ii. Очищеннаго крѣпкаго спирта 90% Spiritus Vini rectif. ℔j

Сабуръ превращаютъ въ крупный порошокъ, настаиваютъ съ спиртомъ въ продолженiи 8-и дней въ закупоренной стклянкѣ, часто взбалтывая; затѣмъ отжимаютъ и процѣживаютъ чрезъ пропускную бумагу.

Получается около тринадцати унцовъ прозрачной настойки, темно-бураго цвѣта, сильногорькаго вкуса. У.

Внутрь: по 5 до 30 капель на прiемъ.

Снаружи: въ примочкахъ (℥j на ℥iv—℥vj воды и промывательныхъ ʒij—ʒiv—

Tinctura amara.

Горькая настойка.

Rp. Травы золототысячника Herbae Centaurii minoris ℥ii Незрѣлыхъ померанцевъ Fructus Aurantii immaturorum ℥ii Корня горечавки Radicis Gentianae rubrae ℥ii Очищеннаго спирта 70% Spiritus vini rectif. ℥viii M.D.S. Внутрь по 20 до 30 капель на прiёмъ

Tinctura antiscorbutica

Противуцынготная настойка

Rp. Свѣжаго хрѣна, Radicis Cochleariae Armoraciae ℥vi
Корневища аира Rhizomatis Calami ℥i
Можжевеловыхъ ягодъ Fructuum Juniperi ℥iiii
Корневища инбиря Rhizomatis Zingiberis ℥i
Сѣмянъ черной горчицы Seminum Sinapis nigrae ℥ß

Очищеннаго спирта 70% Spiritus Vini rectificati ℥j

Внутрь по 20–30 капель на пріемъ, съ виномъ или пивомъ. – Служитъ для приготовленія – [illegible]

Tinctura Arnicae

Настойка цвѣтовъ горнаго баранника

Rp. Цвѣтовъ горнаго баранника Florum Arnicae ℥j

Очищеннаго спирта 70% Spiritus vini rectificati ℥x

Внутрь по 10–30 капель на пріемъ; снаружи для примочекъ и втираній. –

Tinctura aromatica

Ароматная настойка

Rp. Корицы Corticis Cinnamomi Cassiae ʒjv

Плодовъ кардамона Fructuum Cardamomi minorum

Гвоздики Caryophyllorum

Корневища калгана Rhizomatis Galangae

Корневища имбиря Rhizomatis Zingiberis

каждого по унцій ʒa

Очищеннаго спирта 70% Spiritus vini rectificati ℥iv

Внутрь: отъ 30 до 60 капель на пріемъ.

Tinctura aromatica acida

Кислая ароматная настойка.

Rp. Корицы Corticis Cinnamomi Cassiae ℥ij

Плодовъ кардамона Fructuum Cardamomi minoris

Гвоздики Caryophyllorum

Корневища калгана Rhizomatis Galangae

Корневища инбиря Rhizomatis Zingiberis aa ʒ3

Очищеннаго спирта 70% Spiriti vini rectificati ℔jj

Чистой крѣпкой сѣрной кислоты Acidi sulfurici concetrati puri ℥j

Внутрь отъ 10 до 30 капель на пріемъ.

℞ D[ecoc]ti rad. Althaeae ℥x
Spirit. nitrici dulcis
Aq. Lauro-ceras. aa ʒj
Syrupi simplicis ℥β
D.S.

℞ Inf. folior fraxini ℥iβ
Natri nitrici ʒj
T[inctu]rae colchici ʒβ
Syrupi simplicis ℥β
M. D.S.

℞ Aether Acetici ℥β
olei Cajeputi ʒβ
M.D.S.

Принимать через 2 часа
по столовой ложке
Противу разволь-
ствола — + хорошо

принимать через 2 час.
по столовой ложке
от Ломоты

℞ [illegible] ʒβ
[illegible] ʒβ
[illegible] ʒβ
[illegible]
[illegible] язвы

По 10 капель приним.
3 раза в день противу
Ломоты

Rp. Tannini puri ʒj — Для вспрыскиванія
Zinci Sulphurici gr XV — [illegible]
Tinctur. opii crocat. ʒij
Aq. Destillatae ℥IV
M.D.S.

Ofilki Olsowe
i siersé
Brzozowa Skora

Rp. Tinctur. guajaci
" colchici
— veratrini āā ʒij
Extract. Hyoscyami gr. iii
[illegible] по 15 капель
три раза въ день —



Rp. Balsam. Copaivae ℥j
Gummi Arabici ʒß
Extract. Hyoscyami gr ii
Infus. Menthae ℥ß
M.D.S. Emuls.
[illegible]

℞ Trae Guajaci
— Cholchici
— veratrini aa ʒj duas
Extract. aconiti gr iij

M.D.S. Противу ломоте по[illegible]
ранамъ три раза въ денъ

℞ Mixt. Oleosacc. ʒvj
T-rae opii
— nucis vomicae aa ʒβ Противу поносу

℞ Tanini puri gr ij
opii puri gr 1/4
Eleosacch. Menthae ʒj
M.D.S. N 4 четыре порошка [illegible]

℞. Tr^ae Nucis Vomicae
— .. opii aa ℈j — noтъ колинъ проти
Olej Menthae gutt. V. — ву пониосу
M.D.S.

℞. Infus. flor. Samb ℥iij
Spiritus Mindereri ℥β — Принимать каждой
Tartari emetici gr. IV. — часъ по столовой лож
Syrupi Simplicis ℥j — ки, какъ потогонное
M.D.S. — средство

℞. Inf. ~~foliarum~~ Digitalis
ex ℈j / ℥iij — принимать через
Extract. Hyosciami gr. iij — 2 часа по столовой
Syrupi Simpl. ℥β — ложки; отъ
M.D.S. — біения сердца

℞. D^ti Lichenis Island. ℥iij
Syrupi Senegae ℥β — отъ чехотки
M.D.S.

morbi

mortii

℞ Inf. rad. Ipecacuanhae
(ex gr X) ℥iij
Ammon. mur. ʒj
Spirit. Nitrici dulcis ʒij
Syrupi Senegae ℥β mx.

3–4

При воспалении легких

℞ Tr. Valerianae
— Valerianae ää ʒj
Balsami Copaivae ʒβ
Tr. Colchici ʒj
M.D.S.

принимать по 10 капель при засорении тоже
катарх

℞ Emulsio Amygd. dulcis ℥viij
Balsami Copaivae ʒβ
Spiritus nitri dulcis ʒij m. d. s.

Принимать через два часа по столовой ложке против триппера.

℞ Pulv. Cubebar. ʒi
Ext. Cubebar q.s.
Balsami copaivae ʒi
m.f. massa pilular. ex qua
forma ... pilul. pondere
gr ij Consperg. Pulv. Cubebar.

Принимать утром и вечером по 10 pilul. против триппера.



Rp: Aloës
Rad. Jalappae
— rhei aa ʒß
Syrupi cichoriae
q.s. ut f. l. a. pilulae
gr. iii–iv Consperge
Pulv. Licopod..
D.S. Три раза
в день по 2 пилюли

Rp Ol. Jecoris aselli ʒjj
gummi arabici ʒß
Sacchari Albi ʒj
Aq. flor. Aurantior. q.s.
ut f. l. a. Emulsio
D.S. принимать
по 2 столов. ложки
каждые 2½ час.

Rp: Balsami copaivae ʒjjj
Mucilag. g. arab. q.s.
Tinct. opii simpl. ʒj
Spiritus nitr. dulc. ʒj
Aquae calcis ʒjß
Syrupi simpl. ʒß
M.D.S. принимать
по 3 ложки в день
противу хронического
триппера

Rp Ol. Olivarum ʒj
Acidi carbol. ʒjj
при намазываніи на
шпицъ"

Rp Acidi carbol. ʒjj
Aquae destill. ℔ß
[illegible] для
шприца

Rp Ferri jodati ℈j
Extract. dulcamarae
— liquiritiae aa ʒβ
Syr. opiati q. s. ut f. l. a pil.
N 60. consp. 1/0 lycopodii
D. S. no. 2 пилюли 3 раза въ день
Rp Farinae seminum lini exsiccat ℥ij
Capit. papaver. pulv. ʒ xii
M. f. s. Для припарки
на весь животъ
которой прибавляютъ по gutt. xx.-xxx
Laudani liquidi Sydenhami
Rp
1/0 ... gr X
D t d N. XII
co 3 godziny I proszek

℞ Calomel. ℈ß – ʒj
Adipis suilli ℥j
M. D. S. Для втирания
утромъ и вечеромъ
℞ Opii puri gr. vij
Sacchari albi ʒj
M. f. p. Div. in viij
D. S. ~~Принимать~~
4 порошка въ день
~~℞ Fol~~

℞ Potus Acid hydrocl ℥j
D.S. Для питья

℞ Лейб Зелинский

℞ Bicarb. Sodae ʒj
Pulv. rad. Ipecac. gr. iij
Morph. Acetici gr. ij
Elaeos. foenicul. ʒij
M. f. p. Div in 4 p. aeq.
по 2 порошка
въ день отъ кашлю
℞ Tannini puri gr. ij
Opii puri gr. ¼
Elaeos Menthae gr. 20
M. f. p. D. t. d. № 4
чрезъ два часа
по порошку

Rp. Spiritus camphorae

— Juniperi aa ʒj

Aceti squillitici — ʒß

Saponis domestici ʒj

M. D. s. Притирка. Употреблять

тепло.

Rp. Camphorae ʒj

Trae opii crocatae ʒij

Olei Chamomillae cocti

— hyosciami cocti aa ʒj

M. D. S. pro frictione.

Rp. Linimenti volatilis [illegible] ʒj

Tincturae canthari

— aromaticae

Olei rorismarini aa ʒj M. D. S. pro fric

Rp. Olei sem. lini usitatiss. ℥iv
— cap. papaveris ℥ij
Tincturae opii crocatae ℈iv
Chloroformi ℈ij
M. D. S. Примочка.
Rp. Aloës
Rad. Jalappae
— rhei aa ℥β
Syrupi cichoriae q. s. ut f. l. a
pilulae pond. gr. iij – iv.
Consperge pulv. lycopod. D. S.
Три раза в день по 2 пилюли.
Rp. Aloës ℥j
Asae foetidae ℥β
olei carvi gutt. xv.
Syrup. simpl. q. s. ut f. l. a pilul.

D.S. Принимать по 6 пилюли 3 раза
въ день.

Rp. Potionis Riveri ℥vj ʒβ вовремя каждые
Rp. Sulphat. Zinci gr. j минутъ по ложкѣ
Aq. Destillat. ℥j
T-rae opii crocat. ʒβ M.D.S. Глазныя капли
Rp. Infus. Digit. (ex gr. X) ℥iij
Acidi mur. dil. ʒβ Принимать
Syrupi simpl. ℥j ʒβ черезъ 2 часа по
Rp. T-rae opii croc. столовой ложкѣ
Elex. Acid. Halleri aa ʒj Принимать
Rp. T-rae ferri pom. по 10. капель 2 раза
ʒiij въ день отъ мѣсячн.
кровей

Тоже само
какъ первое

W lytrze nafty należy rozpuścić 50 gramów parafiny namoczyć w tym płynie skóre

℞ Aq. Lauroceras. ʒj	
Morphi Acetici gr j	отъ кашлю 2 раза
℞ D ti rad. Salep ℥3	въ день 5 – 10 капель
Mucil. gum. Arab. ʒ3	
Trae opii crocat.	Отъ поносу
— Nucis vom. aa ʒ3	каждый часъ
℞ D ti Altheae ℥3	ложку принять
Acid Muriat. dil. ʒ3	[illegible] ʒVI gr XV
Syrupi Simpl. ʒ3	чрезъ два часа по столо-
M. D. S	вой ложкѣ принимать
℞ Ol. Ricini ʒj	противу запору
	принять на одинъ
	пріемъ
℞ Emuls. Amygd.	Каждый часъ ложку
dulcis ℥j D. S	
℞ Mixt. oleos. ℥ij	при боли живота
	употреблять

Rp. Ext. Cubebar. aether. ℥j
" Rathaniae ℥ß
Succi liquiritiae ℥j
m. f. l. c. pilul. Ab... Consp. cort. cinnam. ℥ß
Утромъ и вечеромъ принимать по 4 pilul. въ 5 ...

Rp. Ext. Cubebar. spirit. ℥j
Mucilag. g. arab. ℥ß
Syrupi Limoniorum
Aquae Menthae piper.
" Amygdal. ℥j
Acidi sulph. dilut. ℥j
m. f. l. a. Mixtura ℥ß.
Въ гонорреѣ совершенно принимать отъ 3 до 4 и 5 разъ въ день по столовой ложкѣ и не по ...
Утромъ и вечеромъ по столовой ложкѣ

Rp. Ext. Cubebarum ℥j
Tinct. Rathaniae ℥ß
Spiritus nitri dulc. ℥j
m. d. S. отъ 20 до 30 капель принимать утромъ и вечеромъ въ виноградномъ винѣ противу гонорреи.

Rp. Pulv. Cubebarum ℥ß
Mellis depurat. q. s.
m. f. Electuarium. по чайной ложкѣ отъ 3 до 4 разъ въ день противу гонорреи.

Rp. Cubebarum
Sanguinis draconis
Ext. Rathaniae ana ℥j
Balsami copaivae q. s.
ut fiat Electuarium принимать по чайной ложкѣ 4 раза въ день противу гонорреи

Rp. Calcarii Sulphur. ℥j
Aether sulphuric. ℥j
принимать каплями на сахарѣ 4 раза въ день по 10 капель — ...

Rp. Carbonii sulphuracei ʒj
Spiritus vini rectif. ʒβ
MDS. принимать отъ 4 до 6 капель черезъ два часа противу ревматизма

Rp. Carbonii sulph. ʒj
Spiritus vini rect. ʒij
MDS. принимать отъ 5 до 10 капель черезъ 2 часа
3 противу ревматизма.

Rp. Carbonii sulphurat. ʒj
Lactis Magnesii ʒij
Sacchari albi ʒij
принимать 4 раза въ день по столовой ложке при увеличенномъ объеме печени и селезенки

Rp. Carbonii sulph. ʒj
Ol. Amygdal. dulc. ʒβ
MDS. Для втиранія при застарелыхъ нервныхъ болях и подагры.

Rp. Carbonii sulph. ʒj
Ol. Olivarum
" Liniment. camph. ʒj
MDS. Для втиранія при ревматизмахъ

Rp. Camphorae ʒj
Carbonii sulph. ʒβ
Spiritus vini rect. ʒij
MDS. Для втиранія при ревматизмахъ

Rp. Pulv. Secale cornuti ʒβ
" Extr. glycyrrhizae
" Gumm. arabic. ää ʒj
MDS. Divid. in 12 part. aeq. DS. Черезъ 1/4 часа принимать по порошку пока не последуетъ остановленія кровотеченія изъ матки

Rp. Secale cornutum ʒj
Herbae Nicotianae ʒj
Infund. Aq. fervent. ʒiij
Elaeosacchari citri ʒj
" cinnamomi ʒj
MDS. Черезъ 1/4 часа по столовой ложке противу кровотеченія изъ матки.

Rp. Olei amygdal. dulc ℥j
Pulv. gummi arab. ℥iij
Aq. fontan. q. s. ut f.
Emulsio ℥vj
Magnes. sulphur. depurat ℥j
Syrupi Mann. ℥vj MDS

Rp. Magnes. sulphuric. dep ℥vj
Mann. elect. ℥ß solv. in
Aq. fontan. fervid. ℥iv
MDS Через час по ½ чайной чашки.

Rp. Magnes. Sulphur. depurat ℥j
solv in Aq. font. ℥vj
Oxymell. simpl. ℥j MDS
Rp. Magnes. Sulphuric. dep. ℥j
solv in
Aq. Chamomill. ℥vj
Ol. Lini recent ℥ß
Succi citri ℥j
Extract. opii gr. ii
Syrupi papaveris rhoead. ℥j
MDS

Sulphur

Взболтавши, принимать через 2 часа по столовой ложке. Противъ воспалительныхъ раздраженій въ кишкахъ.

Jak wyrabiac proch. Wez Funt siarki, dwa Funty węgla z wierzby (węgla wierzby) a szesc Funtow saletry potluc to na proszek w możdzierzu i zmieszaj dobrze

Черезъ часъ по чайной чашкѣ, пока подѣйствуетъ.

Принимать черезъ ¼ часа по столовой ложкѣ, взболтавши смѣсь. Противъ свинцовой колики съ сильными спазм.

Rp. Magnes. Sulphuric. depurat.
T—rae rhei aquos. aa ʒj
Aq. Meliss. ℥iij Mds.

Принимать утромъ и вечеромъ по 2 столов. ложки. Противу гемороидальныхъ припад., особенно противу закрытаго геморроя съ запоромъ.

Rp. Magnes. Sulphurici ʒvj
Decoct. aven. ℥vj Solv. in
Olei lini recent.
Oxymel. simpl. aa ℥j
Mds.

Для клистира. Противувоспалительной клистиръ.

Rp. Kali Hydrojodici ʒj
Aq. Dest. Matae ℥vj
Mds.

три раза въ день отъ ревматизма.

Rp. Ferri Sulphurici
Cali carbonici aa ʒj
Extract. Liquiritiae q.s.
M. f. M. p. ex qua form. pilul. № 30

принимать три раза въ день по двѣ пилюли.

Rp Liquor. Sesquichlorati ferri ʒj

принимать 3 раза въ день по 5 капель на водѣ отъ кровотеченія

Rp Decocti baccar. Juniperi ℥vj
Spirit. Nitrici dulcis ʒj
Oxymel. Scillae ℥ß m.d.s.

Принимать черезъ 2 часа отъ водяники

хорошо
подробно

Rp Inf. Sennae salinae ℥vj
Melis despumati ℥j m.d.s.

Принимать у[до]бствія

Rp Ol. Ricini ℥j

Слабительное

Пересмотрено
[illegible] хорошо

℞ Mixt. Muriat. Ammon ℥vj
Tart. Stibiat. gr Unum
Extract. Hyoscyami gr tres
" Succi liquiritiae ℥j ana
Принимать через два часа по
столовой ложке
— — — — — — — —
℞ Argenti Nitrici gr Unum
Aq destillatae ℥j ana
Глазныя капли
— — — — — — — —
℞ Decoct Seminum lini ℥vj
Extract. Belladon gr tres ana
Глазная примочка
— — — — — — — —
℞ Zinci Sulphur. gr duos
Aq destillata ℥j
Tinct opii crocat. gutt 8 / капли

Капли Иноземцева

℞ Tinctur. opii crocat. ʒ3
Vini Ipecacuanh ʒj
Tinctur. Valerian aether. ʒjj
Olei Menthae gutt. X.
Tinct nucis vomic ʒ3. m. d. s.
приемъ отъ 5 до 25 капель.-

Для глаза
[illegible]

Настойка корицы.

℞ Corticis Cinnamomi cassiae, пять унцій
Spiritus Vini rectificati два фунта
настаивать въ продолженіи 8-ми дней
ч. Внутрь по 20 до 60 капель

Tinct. Arnicae

℞ Infus. spec. pectoralis ℥vj
Vini stibiati ʒii
Morphii acetici gr. j
Liquor ammoni anisati ʒß
Syrupi simpl. ℥j ms.

Принимать через два часа по столовой ложкѣ отъ катарра легкихъ.—

℞ Chinini Sulfurici
Zinci Sulfurici aa gr. IV
Aq. Destillatae ℥iv ms.
Спринцевать отъ бленорреи

[illegible] на темя [illegible]

Dosis

Rp. Aquae Chlori

Syrupi Simpl aa ℥j m

M.D. Для намазыванія кисточкою.

Противу Гнилостной Молочницы и язвъ во рту.—

Rp. Aq. Chlori

" Destillatae aa ℥iv [illegible]

M.D. Для умыванія

Rp. Aq. Chlori ℥j

Ol. Olivarum ℥j m. f.

Смѣшавши, хорошо втирать противъ застарѣлой чесотки, лишаевъ.—

Rp. Acid. Carbolici ℥j m

Olei Olivarum ℥j m. f.

Для перевязки застарѣлыхъ ранъ

[illegible]

[illegible]

℞ D[ecoc]ti rad. Senegae (ex ℥ij) ℥vj
Liq. Ammonii anisati ʒj
Vini Stibiati ʒß
Morphii Acetici gr j unum
Syrupi Simpl. ℥j omnium
M.D.S. Принимать черезъ два часа по столовой ложкѣ
Отхаркивающее средство

℞ Ung. Hydrargiri ℥j
Camphorae gr XX
Extract Beladon. gr X
Ol. Hyosciam. ℥ß
M.D.S. Наружное

Rp. Ferri Lactici gr. ij
Sacchari Albi gr. v.
M. f. p. D. t. N 20

Принимать три порошка въ день отъ Бели.—

Rp. Tinct. Ferri pomat. ℥j

/. Принимать по 20 капель на пріемъ три раза въ день

Rp. Liquor. Sesquichlorati ferri
Aq. Destillatae aa ʒij

M. D. S. Принимать 2 раза въ день по 5 капель противу кровотеченій

Rp. Bicarb. Sodae
& Rhei aa gr. x
M f p D. t d N 12

Принимать четыре порошка въ день отъ [illegible] которые желудка

Rp. Liq. Anodin ʒ 3
Ol. Tereb. gallic
Aeth. Sulf. ac. aa ʒj
2 [illegible] [illegible] 10

Rp. Vini colchici ℥ tres
Tinct. opii crocat. ℥j
Extract. Aconiti gr. ß
M. D. S. Принимать 3 раза въ день противу ломоты по 15 капель —

\#

Rp. Chlorophormi ℥j
Veratrini gr. VI
Olei Olivarum ℥ß
M. D. S. втиранье противу ломоты

Rp. Ung. [illegible] дубовые ℥ß
Bal. peruvian. nigr. ℥j
Us. externo

Rp. Bicarb. Sodae gr. IV
Morphii Acetic gr. 1/8
Sacchari albi gr. III
M. f. p. d. t. dos. № 8
Принимать четыре раза въ день по одному порошку отъ кашлю

Rp. Spirit. camphor.
— Saponati aa ℥III
Tinct. opii ℥j
Ammonii liquid. ℥II
M. D. S. Натирание

Rp. Glycerini
Танинъ [illegible]
[illegible]

Rp. Morphii Acetici gr I
Magisterii Bismuthii gr X
Elaeosacchari menthae ʒiß
M f p Dividae in part. aeq. N 8
S. Принимать три раза в день
по одному порошку — при
запоре отвечающихъ дозей

Rp. Mixt. Bals. copaivae ℥ij
Nitri puri ʒi
Aq. Lauro-cerasae ʒß
Syrupi Simplicis ℥i MDS
черезъ 2 часа по столовой
ложкѣ принимать

Rp Infus. Secali cornuti (ex ʒß) ℥vj
Elix. acid. Halleri ʒj
Liquor. Sesquichlorati ferri ʒjj
Syrupi Simplicis ℥j M.D.S.

Принимать через 2 часа по столовой ложке противу кровотечения

#

Rp Morphii Muriatici gr. j
Vini Stibiati
Aq. Amygd. Amar. aa ʒjj
M.D.S. Принимать три раза въ день по 15 капель

#

Rp Sp. Mindereri ℥ij
Trae aconiti
Aq. Laurocerasi aa ʒß ...

H

Rp Lotus Salviae fer ℥j ℥vj
Liq Anod. Hoffmani ʒj
Aluminis crud ʒij
Syrupi Simpl ℥j md s

Pocieskanie

Rp Ung hyd. cinerei ʒj
Opii puri
Extract Belladon aa gr X
Chloroformi ʒj md s
Втирать противу затверденья
яичекъ и бубона

Rp. Chinini Sulphurici ℈j

Ferri hydrogeni reducti ʒj semis

Sacchari albi ʒjj

M. f. p. Divid. in part. aequal. № 20

Принимать по одному порошку

после обеда и ужина, противу

худосочия

Rp. Morphii muriatici gr. j unum

Vini Stibiati

Aq. Amygdal. Amararum aa ʒβ

M. D. S. через два часа по 20 капель

Противу кашля

+

Rp. Ferri Carbon. Sacch. gr. ij

Sacchari albi gr. v

M. f. p. № 30 [illegible]

Rp. Kali Nitrici ʒii
Aq. Destillatae ℥vi
Syrupi simplicis ℥i
M.D.S. принимать черезъ 2 часа
по столовой ложке противу
резей

Rp. Zincum Sulphuricum gr XII -6
Plumbi Acetici gr VI - 3
Calcariae carbonicae ℈i 10
Tinct. Opii crocatae ʒii 1
Aquae Rosarum ℥vi M.D.S.

Глазные капли можно пущать
въ глазъ здоровымъ здаровать

℞ Ung. Hydrargr. ℥j
Extract. Belladon. gr XX.
Camphorae trisi gr XXX
M. f. Unguent. втирать
противъ бубона.—

℞ Ung. Kali Iodati ℥j
Iodi puri gr X M.D.S.
противъ этого же

℞ Ung. Camphorat ℥j D.S.
Наружное

III

℞ Dti Althaeae ℥ß

Nitri puri ʒ3

Tartari Emetici gr j Unum

Extract Hyoscyami gr III

MDS через 2 часа по сто-
ловой ложке принимать
как отхаркивающее
средство

℞ Bicarbonat Sodae gr IV

Morphii Muriat. gr 1/4

Sulphur. Aurat. Antim. gr 1/4

~~Sacc~~har. Eleol. Anis. gr VI

M f p D. t. d N 8 четыре
порошка в день

при кашле

Tinct. opii ʒi.
— Menthae aa ʒii
Chloroformi ℈ii
Acidi carbol. cryst gr. xii

V-XV-84 года

Околодокъ

Зубные капли

1883 года

Городъ Тамбовъ

9 Гренадерской

Сибирской Полкъ

Сія

Книга Принадлежитъ

Осипу Зелинскому

sator
arepo
tenet
opera
rotas

131



55

25

96

5 doll

